



CRDPSS

Clinician-Rated Dimension of Psychosis Symptom Severity

Evaluation de la sévérité des dimensions symptomatiques de la psychose par le praticien

v. 29/12/2013 (DSM-V, trad. JR Foucher)

<http://www.cercle-d-excellence-psy.org>

Nom : _____

Prénom : _____

ou code : _____

Date : __ / __ / ____

Enregistrer le niveau de sévérité le plus important de ces 7 derniers jours.

1 - Hallucinations.

- | | |
|--|-----------------------------|
| 0. Absentes. | 0. <input type="checkbox"/> |
| 1. Douteuses (sévérité ou durée insuffisantes pour être considérées comme psychotiques). | 1. <input type="checkbox"/> |
| 2. Présentes, mais légères (peu d'incitation à suivre les injonctions, peu gêné par les voix). | 2. <input type="checkbox"/> |
| 3. Présentes mais modérées (incité à répondre aux voix, gêné par elles). | 3. <input type="checkbox"/> |
| 4. Présentes et sévères (très incité à répondre aux voix, très gêné par elles). | 4. <input type="checkbox"/> |

2 - Délires.

- | | |
|--|-----------------------------|
| 0. Absents. | 0. <input type="checkbox"/> |
| 1. Douteux (sévérité ou durée insuffisantes pour être considérés comme psychotiques). | 1. <input type="checkbox"/> |
| 2. Présents, mais légers (peu d'incitation à agir selon ses idées délirantes, peu gêné par elles). | 2. <input type="checkbox"/> |
| 3. Présents mais modérés (incité à agir selon ses idées délirantes, gêné par elles). | 3. <input type="checkbox"/> |
| 4. Présents et sévères (très incité à agir selon ses idées délirantes, très gêné par elles). | 4. <input type="checkbox"/> |

3 - Désorganisation du discours.

- | | |
|--|-----------------------------|
| 0. Absente. | 0. <input type="checkbox"/> |
| 1. Douteuse (sévérité ou durée insuffisantes pour être considérée comme pathologique). | 1. <input type="checkbox"/> |
| 2. Présente, mais légère (quelques difficultés à suivre le discours). | 2. <input type="checkbox"/> |
| 3. Présente mais modérée (propos difficiles à suivre). | 3. <input type="checkbox"/> |
| 4. Présente et sévère (propos quasi impossibles à comprendre). | 4. <input type="checkbox"/> |

4 - Perturbation du comportement psychomoteur.

- | | |
|---|-----------------------------|
| 0. Absente. | 0. <input type="checkbox"/> |
| 1. Douteuse (sévérité ou durée insuffisantes pour être considérée comme pathologique). | 1. <input type="checkbox"/> |
| 2. Présente, mais légère (occasionnelles perturbations ou bizarreries du comportement psychomoteur ou catatonie). | 2. <input type="checkbox"/> |
| 3. Présente mais modérée (fréquentes perturbations ou bizarreries du comportement psychomoteur ou catatonie). | 3. <input type="checkbox"/> |
| 4. Présente et sévère (quasi constantes perturbations ou bizarreries du comportement psychomoteur ou catatonie). | 4. <input type="checkbox"/> |

5 - Symptômes négatifs (réduction des expressions émotionnelles ou aboulie).

- | | |
|--|-----------------------------|
| 0. Absents. | 0. <input type="checkbox"/> |
| 1. Réduction douteuse de l'expressivité du visage, de la prosodie, de la gestuelle ou des comportements auto-initiés. | 1. <input type="checkbox"/> |
| 2. Présents, mais réduction légère de l'expressivité du visage, de la prosodie, de la gestuelle ou des comportements auto-initiés. | 2. <input type="checkbox"/> |
| 3. Présents, et réduction modéré de l'expressivité du visage, de la prosodie, de la gestuelle ou des comportements auto-initiés. | 3. <input type="checkbox"/> |
| 4. Présents, et réduction sévère de l'expressivité du visage, de la prosodie, de la gestuelle ou des comportements auto-initiés. | 4. <input type="checkbox"/> |

6 - Troubles cognitifs.

- | | |
|---|-----------------------------|
| 0. Absents. | 0. <input type="checkbox"/> |
| 1. Douteux (fonctions cognitives non en dehors des limites attendues pour l'âge et le SSE, c.à.d. < 0.5 ET de la moyenne). | 1. <input type="checkbox"/> |
| 2. Présents, mais légers (quelques altérations cognitives; en dessous des limites attendues pour l'âge et le SSE, c.à.d. 0.5 - 1 ET de la moyenne). | 2. <input type="checkbox"/> |
| 3. Présents mais modérés (altérations cognitives évidentes; en dessous des limites attendues pour l'âge et le SSE, c.à.d. 1 - 2 ET de la moyenne). | 3. <input type="checkbox"/> |
| 4. Présents et sévères (altérations cognitives sévères; en dessous des limites attendues pour l'âge et le SSE, c.à.d. > 2 ET de la moyenne). | 4. <input type="checkbox"/> |

ET = écart-type, SSE = statut socio-économique.

7 - Dépression.

- | | |
|---|-----------------------------|
| 0. Absente. | 0. <input type="checkbox"/> |
| 1. Douteuse (se sent parfois triste, abattu, déprimé ou désespéré; concerné par un échec sans être préoccupé). | 1. <input type="checkbox"/> |
| 2. Présente, mais légère (fréquentes périodes de tristesse, d'abattement, modérément déprimé ou désespéré; concerné par un échec et en être quelque peu préoccupé). | 2. <input type="checkbox"/> |
| 3. Présente mais modérée (fréquentes périodes de profonde dépression ou de désespoir; préoccupations avec sentiment de culpabilité d'avoir mal fait quelque chose). | 3. <input type="checkbox"/> |
| 4. Présente et sévère (profonde dépression ou désespoir quotidiens; culpabilité délirante ou se fait des reproches déraisonnables, hors de proportion par rapport circonstances). | 4. <input type="checkbox"/> |

8 - Manie.

- | | |
|--|-----------------------------|
| 0. Absente. | 0. <input type="checkbox"/> |
| 1. Douteuse (occasionnelle élévation de l'humeur, thymie expansive, irritabilité ou agitation). | 1. <input type="checkbox"/> |
| 2. Présente, mais légère (fréquentes périodes d'élévation de l'humeur, de thymie expansive, d'irritabilité ou d'agitation modérées). | 2. <input type="checkbox"/> |
| 3. Présente mais modérée (fréquentes périodes d'élévation de l'humeur, de thymie expansive, d'irritabilité ou d'agitation). | 3. <input type="checkbox"/> |
| 4. Présente et sévère (élévation de l'humeur, thymie expansive, irritabilité ou agitation quotidiennes et intenses). | 4. <input type="checkbox"/> |